

PARA PREVENIR LA HIDATIDOSIS, NO ALIMENTE A LOS PERROS CON VÍSCERAS

Es una zoonosis parasitaria que se extiende en todo el territorio argentino y tiene importantes consecuencias en la salud pública. El parásito se encuentra en el intestino de los perros y se transmite a través de su materia fecal.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA HIDATIDOSIS?

Faena en campo

Los animales son faenados y los perros comen sus vísceras crudas con quistes hidatídicos.

Perro infectado

Los parásitos se desarrollan en el intestino de los perros y sus huevos son eliminados con la materia fecal.

Contaminación del ambiente

Los huevos de los parásitos eliminados por los perros contaminan pastos, huertas y aguas.

Animales infectados

Los animales consumen agua o pasturas contaminadas con huevos de parásitos, luego se forman los quistes en sus órganos.

Personas

Adquieren la enfermedad al estar en contacto cercano con perros o consumir alimentos contaminados con huevos del parásito.

ESTRUCTURA RECOMENDADA PARA FAENAR EN CAMPO



Disponga de un espacio para incinerar o un pozo sanitario para eliminar las vísceras.

Cerque el pozo sanitario y el área de sacrificio para que no ingresen los perros.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

- Nunca alimente a los perros con vísceras crudas.
- Mantenga a los perros lejos de los lugares donde se faena.
- Cerque las huertas para que los animales no tengan acceso.
- Lave sus manos y las de los niños luego de estar en contacto con los animales o la tierra.
- Desparasite a los perros en zonas rurales cada 45 días y cada 4 a 6 meses en zonas urbanas.